

Venpunktion patientinformation, hela kliniken

ALLMÄNNA RÅD VID PROVTAGNING OCH INTRAVENÖSA INJEKTIONER FÖR DIG SOM HAR NEDSATT NJURFUNKTION.

Syfte: Att skona blodkärl för framtida bruk.

- Helst bör din s.k. dominant arm användas för kärlpunktioner (dvs. höger arm om du är högerhänt).
- Handryggens blodkärl är bra att använda, om det är möjligt.
- Se till att hålla handen/armen så varm som möjligt inför provtagning/injektion.
- Tunna nålar bör användas, t.ex. s.k. "butterfly"-nålar.
- Om blodkärlen är tunna kan man prova med att "träna upp" dem, genom att regelbundet krama en mjuk kudde/boll. Fråga efter en sådan på Njurmedicinska mottagningen.

Vid eventuella frågor - kontakta gärna oss på Njurmedicinska mottagningarna, Karolinska Universitetssjukhuset.

Solna Tfn 08-517 724 28

Huddinge Tfn 08-585 825 00



Handläggare: Malin Lindén/Karolinska/SLL
Fastställare: Eva MAR Johansson/Karolinska/SLL
Organisation: Njurmedicinska kliniken

Dokumentnr: Kar2-5362
Version: 1
Giltig fr o m: 2012-09-28
Utskriftsdatum: 2014-12-04

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

Versionshistorik

Varje dokument bör innehålla en historik som för varje version talar om vad som ändrats, vem som gjort ändringen och när ändringen gjordes.

Version	Datum	Förändring och kommentar	Ansvarig
1	2013-09-18	Version 4 överförd från gamla Inuti. Reviderad av Agneta Pagels 2012-09-14. Originalversion utarbetad av Agneta Pagels, Annelie Magnusson 2007-07-23.	Lena Svedberg

Handläggare: Malin Lindén/Karolinska/SLL
Fastställare: Eva MAR Johansson/Karolinska/SLL
Organisation: Njurmedicinska kliniken

Dokumentnr: Kar2-5362
Version: 1
Giltig fr o m: 2012-09-28
Utskriftsdatum: 2014-12-04