

INSÄTTNING SSRI (i första hand escitalopram eller sertralin om inte tidigare god effekt av annat).	2 V UPPFÖLJNING			
		Kontroll av biverkningar. Ökar till adekvat dos. Motivera fortsatt medicinerings.		
	4 V UPPFÖLJNING			
	Tydligt behandlingsvar	Besvärliga biverkningar	Utebliven effekt	Viss behandlingsvar
	Fortsatt behandling med nuvarande dos	Byt preparat och startar om algoritmen.	Höj dosen till övre delen av rekommenderade behandlingsintervall.	
	6-8 V UPPFÖLJNING			
	Remission	Besvärliga biverkningar	Utebliven effekt	Viss behandlingsvar
		Byt preparat. Byte till ett annat SSRI lika effektivt som byte till en annan läkemedelsklass.		Sätt in tilläggsbehandling. (Mirtazapin i första hand).
	12 V UPPFÖLJNING			
	Tydligt behandlingsvar	Besvärliga biverkningar	Utebliven effekt	Viss behandlingsvar
Fortsatt behandling med nuvarande dos.	Remiss till psykiatrisk klinik.	Höj dosen till övre delen av rekommenderade behandlingsintervall.		
16 V UPPFÖLJNING				
Remission	Besvärliga biverkningar	Utebliven effekt	Viss behandlingsvar	
	Remiss till psykiatrisk klinik.		Sätt in tilläggsbehandling. (Mirtazapin i första hand).	
20 V UPPFÖLJNING				
Remission	Besvärliga biverkningar	Utebliven effekt	Viss behandlingsvar	
	Remiss till psykiatrisk klinik.		Höj dosen till övre delen av rekommenderade behandlingsintervall.	
24 V UPPFÖLJNING				
Remission	Besvärliga biverkningar	Utebliven effekt	Viss behandlingsvar	
	Remiss till psykiatrisk klinik.			

Fortsatt behandling 6-12 månader